




Les espèces en péril :

- Selon les lois fédérales et/ou provinciale, UICN et CITES
- Potentiellement présentes : 35 espèces
- Présence avérée : 9 espèces animales et 2 espèces végétales aquatiques
- En cas de rencontre de ces espèces, que faire ?

Groupe	Nom commun	Nom scientifique	Nom anglais	Statut fédéral	Statut Provincial	UICN	CITES	Nombre d'occurrences	Impact de l'aménagement forestier
Oiseaux	Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Bald eagle	Non en péril	Vulnérable	Préoccupation mineure	II	155	Faible
Oiseaux	Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	Nighthawk, Common	Menacée	Susceptible	Préoccupation mineure	-	8	Faible
Oiseaux	Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>	Flycatcher, Olive-sided	Menacée	Susceptible	Quasi menacée	-	14	Faible
Oiseaux	Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>	Warbler, Canada	Menacée	Susceptible	Préoccupation mineure	-	298	Notable
Oiseaux	Quiscalc rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>	Blackbird, Rusty	Préoccupante	Susceptible	Vulnérable	-	24	Faible
Oiseaux	Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Horned grebe	Non en péril	Menacée	Préoccupation mineure	-	5	Faible
Oiseaux	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Golden eagle	Non en péril	Vulnérable	Préoccupation mineure	II	2	Faible
Mammifère	Cougar	<i>Puma concolor</i>	Cougar	Non en péril	Susceptible	Préoccupation mineure	II	1	Faible
Mammifère	Chauve-souris rousse	<i>Lasiurus borealis</i>	Red bat	-	Susceptible	Préoccupation mineure	-	1	Faible
Plantes	Nymphéa de Leiberg	<i>Nymphaea leibergii</i>	Small white water lily	Non en péril	Susceptible	-	-	1 population	Faible
Plantes	Amoraciac des étangs	<i>Rorippa aquatica</i>	Lake cress	Non en péril	Susceptible	-	-	1 population	Faible



Pygargue à tête blanche

Haliaeetus leucocephalus, Bald eagle



- Envergure : de 1,80 m à 2,20 m
- Nid :
 - peut atteindre 4 mètres de profondeur, 2,50 mètres de diamètre
 - fait principalement de branches et placé dans un grand arbre près de l'eau

Mesures

- Rayon de 300 m autour des nids en protection intégrale et zone additionnelle de 400 m où les interventions sont interdites entre le 15 mars et le 31 août
- Aucune infrastructure n'est permise dans cette zone tampon de 400 m

Aigle royal

Aquila chrysaetos, Golden eagle



- Envergure : de 2 m à 2,20 m
- Nid :
 - jusqu'à 2 ou 3 m de diamètre avec une profondeur de 90 cm et peut atteindre 2 m de haut
 - construit de branches et d'herbes au fond garni de mousse, sur des grands pins ou dans des falaises.

Chauve-souris rousse

Lasiurus borealis, Red bat



- Mâle roux à rouge brique et femelle jaune à brun, les deux avec des tâches blanchâtres distinctives sur les épaules et un collier d'apparence plus pâle
- Taille : entre 93 et 117 mm pour le corps et une envergure de 290 à 332 mm
- Habitat : espèce forestière mais s'alimente dans les aires ouvertes

Cougar

Puma concolor



© Canadian Museum of Nature / Musée canadien de la nature
Photo : Valerie J. May



- Envergure : de 1,50 m à 2,70 m (longueur queue : 50 cm à 90 cm)
- Pelage uni et de couleur fauve

Engoulevent d'Amérique

Chordeiles minor , Nighthawk Common



- Taille moyenne avec une grosse tête aplatie, de grands yeux, un petit bec, une grande bouche, de longues ailes effilées et pointues ainsi qu'une longue queue légèrement encochée
- Plumage brun foncé tacheté de noir, de blanc et de chamais
- Habitat de reproduction : habitats ouverts dépourvus de végétation (affleurements rocheux, zones déboisées...)

Paruline du Canada

Wilsonia canadensis, Warbler, Canada



- Parties supérieures bleu gris uni, les parties inférieures jaune canari, et les sous caudales blanches.
- Cercle orbitaire blanchâtre et une tache jaune sur les lores.
- Mâle : collier de taches noires en travers du haut de la poitrine, ainsi que sur les côtés de la face et le front.
- Femelle : collier plutôt gris foncé.

- Habitat : strate arbustive en forêt

En cas de rencontre...

- Ne pas déranger
- Communiqué l'information à Claude-Michel Bouchard avec si possible un point GPS et une photo